

SYNTHESE NATIONALE DES PRELEVEMENTS A LA CHASSE DE NUIT AU GIBIER D'EAU - SAISON 2005-2006



Régis Hargues*, Vincent Schricke, François Auroy*, Jean-Pierre Arnauduc***

*Fédération Nationale des Chasseurs – 13, rue du Général Leclerc – 92136 Issy les Moulineaux Cedex

**Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage – 53, rue de Russeil – 44000 Nantes

INTRODUCTION

Conformément à l'arrêté du 22 juin 2005 modifiant celui du 21 janvier 2004, la FNC et l'ONCFS publient chaque année un bilan des prélèvements réalisés par la chasse de nuit en France. Après le premier rapport national pour la saison 2004-05, cette synthèse présente les résultats globaux pour la saison de chasse 2005-2006. Seul un bilan des prélèvements nationaux est présenté dans ce rapport. Une analyse plus approfondie des données est envisagée à court terme et fera l'objet d'une publication ultérieure, comme nous l'avons fait pour les données de la saison précédente (article en cours de publication dans le rapport scientifique 2006 de l'ONCFS).

RESULTATS

Participation des FDC

La participation des Fédérations a été très importante en 2005/06 puisque 25 sur 27 concernées ont participé (22 pour la saison 2004/2005).

En terme de retour des carnets, la base de données nationale recense 787 carnets d'installations utilisées uniquement sur le Domaine Public Maritime et 5 641 carnets d'installations utilisées sur le Domaine terrestre ou sur le Domaine Public Fluvial.

Par comparaison avec la saison précédente, on constate une augmentation de 77% du nombre d'installations saisies¹ (6 428 contre 3 621 la saison précédente) et une progression de 29% concernant le nombre de carnets retournés en FDC.

Rappelons que l'automne-hiver 2005/2006 a été marqué par l'épisode de grippe aviaire qui a conduit le gouvernement à prendre plusieurs arrêtés et décrets, concernant notamment la pratique de la chasse au gibier d'eau. Nous signalerons en particulier l'arrêté du 24 octobre 2005 ayant interdit le transport et l'emploi des appelants vivants sur tout le territoire national jusqu'au 1^{er} décembre 2005 dans un premier temps et reconduit jusqu'à la fin de saison ensuite. Malgré ce climat peu favorable, nous avons noté une dynamique très positive en terme de retour des informations des installations chassées.

Les Prélèvements

La saison 2005-2006 est atypique du fait d'une importante modification des pratiques de chasse suite à l'arrêté du 24 octobre 2005 interdisant l'emploi des appelants vivants des espèces de gibier d'eau. Cette interdiction perdurera jusqu'à la fin de la saison, seuls des « aménagements » locaux ont été obtenus par endroit permettant notamment l'utilisation des cages hors de l'eau.

Un biais important sera donc présent dans les futures analyses des prélèvements réalisés cette saison. Les Figures 1 et 3 montrent une baisse des prélèvements en Novembre. Il est difficile sans analyses plus approfondies de conclure sur l'origine de cette baisse. En effet, la publication ultérieure mettra en relation la fréquentation des huttes à cette période (effet grippe aviaire) avec les prélèvements ainsi qu'avec l'interdiction d'utilisation des appelants vivants.

¹ Installation saisie : correspond à une installation de chasse de nuit dont les données de prélèvements sont saisies sur informatique dans la base de données nationale.

DPM	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	TOTAL
COLVERT	302	725	482	163	213	189	2080
CHIPEAU	34	114	149	89	137	123	665
PILET	18	336	1365	87	154	223	2184
SIFFLEUR	20	946	2918	617	1737	1144	7389
SOUCHET	251	734	573	112	239	176	2110
MILOUIN	14	46	70	44	43	21	246
MORILLON	5	22	34	42	16	9	132
NETTE ROUSSE	1	4	3	1	1	6	16
OIE CENDREE	2	2	17	20	18	16	75
OIE RIEUSE	0	1	21	26	19	20	88
OIE DES MOISSONS	1	1	13	0	0	0	14
SARCELLE ETE	52	67	47	11	9	13	224
SARCELLE HIVER	1046	4466	4795	747	2056	1652	14965
FOULQUE	61	289	212	47	20	18	657
AUTRES	25	72	54	22	36	37	253
TOTAL	1832	7825	10753	2028	4698	3647	30783
%	5,86	25,02	34,38	6,48	15,02	11,66	

Tab.1. Prélèvement mensuel et par espèce réalisé sur le Domaine Public Maritime (n= 30 783)




Fig. 1. Distribution des prélèvements sur le DPM en 2005-2006 (n= 30 783)

PROPORTION (%) DES ESPECES PRELEVEES SUR LE DPM




Fig.2. Proportion (%) des différentes espèces prélevées sur le DPM

HORS DPM	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	TOTAL
COLVERT	18577	16634	8962	6054	4868	4230	59325
CHIPEAU	347	932	1461	1371	1413	1398	6922
PILET	95	802	2701	882	707	949	6136
SIFFLEUR	167	2205	6198	4280	6320	5814	24984
SOUCHET	1756	4140	3418	1925	1975	1781	14995
MILOUIN	204	696	1033	795	618	822	4168
MORILLON	125	406	470	470	353	280	2104
NETTE ROUSSE	5	17	36	47	33	19	157
OIE CENDREE	47	34	252	554	339	411	1637
OIE RIEUSE	7	7	84	104	258	311	771
OIE DES MOISSONS	16	19	26	48	64	50	223
SARCELLE ETE	685	1124	541	95	115	67	2627
SARCELLE HIVER	4910	16878	18238	7878	11229	9990	69123
FOULQUE	1573	2523	1757	774	839	928	8394
AUTRES	937	1917	1997	1146	970	676	7643
TOTAL	29451	48334	47174	26423	30101	27726	209209
%	14,04	23,04	22,49	12,60	14,35	13,22	

Tab.2. prélèvement mensuel et par espèce réalisé hors du Domaine Public Maritime (n=209 209)




Fig.3. Distribution des prélèvements hors DPM en 2005-2006 (n=209 209)




Fig.4. Proportion (%) des différentes espèces prélevées hors du DPM (Domaine terrestre + Domaine Public Fluvial)

DISCUSSION ET CONCLUSION

Pour la saison 2005-2006, l'analyse des résultats globaux montre un prélèvement total de plus de 240 000 oiseaux d'eau, composé en majorité d'anatidés (canards en particulier) et de foulques macroules.

Comme mis en évidence lors de la saison 2004/05, nous confirmons que la Sarcelle d'hiver, le Canard colvert et le Canard siffleur représentent la majorité du tableau (73% du tableau hors DPM et 79% sur le DPM), en précisant toutefois que le Canard colvert est la deuxième espèce prélevée sur le domaine terrestre et le Canard siffleur, la deuxième sur le domaine public maritime.

Le jeu de données obtenu en 2005/06 devrait permettre une analyse plus fine des résultats et améliorer ainsi nos connaissances sur les prélèvements réalisés par ce mode de chasse. Il faudra néanmoins bien tenir compte de la spécificité de cette saison là avec l'épisode de la grippe aviaire dont les conséquences (interdiction totale de l'utilisation des appelants en novembre 2005) ont probablement eu un impact sur les résultats.

Les données acquises au cours de la saison 2005/06 montrent une fois de plus tout l'intérêt que les chasseurs et leurs fédérations départementales portent à cette enquête nationale annuelle.

Contact des Auteurs:

rhargues@chasseurdefrance.com

vincent.schricke@oncfs.gouv.fr